

Doseringschema peroralt vitamin K

Denna information riktar sig till föräldrar som bestämt sig för att deras nyfödda barn inte ska få injektion med vitamin K. Föräldrarna bör först ha läst igenom föräldrainformationen (separat dokument) och erbjudits information från barnläkare.

Vårdpersonalen ger barnet första dosen strax efter födelsen som 0,2ml (vilket motsvarar 2mg Vitamin K) av den flytande lösningen Konakion Novum (10mg/ml).

Därefter, med start vid 1 veckas ålder, ges **1 kapsel NeoKay en gång i veckan i 12 veckor**. Varje kapsel innehåller 1 mg vitamin K upplöst i kokosolja. Du får med Dig en förpackning med 12 st. kapslar före hemgång. Den mjuka kapseltoppen klipps lätt av och kapselns innehåll trycks ut i barnets mun (se bild i informations-broschyren som följer med läkemedlet). Om barnet kräks inom 30 min efter given dos, upprepa då samma dos.

- Använd gärna tabellen nedan och skriv in datum varje gång ni ger barnet veckodosen.
- Ge dosen vid samma klockslag, då minskar risken att det glöms bort.

Behandlingen avslutas när barnet är 12 veckor gammal.

Eftersom K-vitamin brist är förknippat med risk för allvarliga blödningar, bl.a. hjärnblödning, hos det nyfödda barnet, är viktigt att Ditt barn får samliga doser för att fullt skydd ska uppnås, speciellt om barnet ammas helt.

Datum	Datum
Dos 1 given _____	Dos 7 given _____
Dos 2 given _____	Dos 8 given _____
Dos 3 given _____	Dos 9 given _____
Dos 4 given _____	Dos 10 given _____
Dos 5 given _____	Dos 11 given _____
Dos 6 given _____	Dos 12 given _____